



## IMPFE MPFEHLUNGEN

Seite 1 von 2

### GEGEN TETANUS

Pferde	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung 2. Wiederholung nach 4-8 Wochen 3. Wiederholung nach 1 Jahr	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> 1-2 Jahre (je nach Präparat)
--------	---	--

Fohlen	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung im 6. Lebensmonat 2. Wiederholung im 8./9. Lebensmonat	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> 1-2 Jahre (je nach Präparat)
--------	---	--

### GEGEN INFLUENZA

Pferde	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung 2. Wiederholung nach 4-8 Wochen 3. Wiederholung nach 6 Monaten (LPO Pflicht)	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> FN Turnierpferde: alle 6 Monate Freizeitpferde: alle 12 Monate / jährlich
--------	--	--

Fohlen	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung im 5. Lebensmonat 2. Wiederholung im 7. Lebensmonat 3. Wiederholung im 13./14. Lebensmonat	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> FN Turnierpferde: alle 6 Monate Freizeitpferde: alle 12 Monate / jährlich
--------	--	--

### GEGEN HERPES

Pferde	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung 2. Wiederholung nach 4-8 Wochen 3. Wiederholung nach 6 Monaten	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> Turnier- und Freizeitpferde: alle 6 Monate
--------	--	--

Fohlen	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung im 5. Lebensmonat 2. Wiederholung nach 4-8 Wochen	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> alle 6 Monate
--------	--	---

### GEGEN TOLLWUT

Pferde	<b>Grundimmunisierung</b> 1. 1x jährlich ohne Grundimmunisierung	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> alle 12 Monate / jährlich
--------	---	---

Fohlen	<b>Grundimmunisierung</b> 1. Impfung im 6. Lebensmonat	<b>Regelmäßige Nachimpfung</b> alle 12 Monate / jährlich
--------	---	---

## ENTWURMUNGS-PROGRAMM

Seite 2 von 2

JAHRESZEIT	ERKLÄRUNG + PRÄPARATE
Winter	<p><b>Equimax</b> (Kombipräparat, Wirkstoffe: Ivermectin und Praziquantel) oder</p> <p><b>Ivomec</b> (Wirkstoff: Ivermectin) <b>Eraquell</b> (Wirkstoff: Ivermectin) + <b>Droncit</b> (Wirkstoff: Praziquantel) <b>Furexel</b> (Wirkstoff: Ivermectin)</p> <p>Eine Entwurmung gegen Bandwürmer ist zusätzlich nach dem ersten Frost sinnvoll, da der Überträger - die Grasmilbe - durch den Frost abgetötet wird und sich das Pferd nicht erneut infizieren kann.</p>
Frühjahr	<b>Equest</b> (Wirkstoff: Moxidectin)
Sommer	<b>Panacur</b> (Wirkstoff: Benzimidazol - auch für Fohlen geeignet) <b>Jernadex</b> (Wirkstoff: Pyrantel) oder <b>Banminth</b> (Wirkstoff: Pyrantel)
Herbst	<b>Eraquell</b> (Wirkstoff: Ivermectin)

Bitte beachten Sie, dass zusätzlich zur selektiven Entwurmung eine penible Weidehygiene vor starkem Wurmbefall sowie einer Wiederaansteckung schützen kann. Vor allem in den ersten drei Tagen nach dem Entwurmen ist die Ausscheidung von Wurmeiern erhöht - in dieser Zeit sollten Sie täglich die Pferdeäpfel auf der Weide / Koppel absammeln sowie die Stallbox komplett ausräumen.

Im Alltag sollten Pferdeäpfel daher mindestens einmal pro Woche von der Weide / Koppel entfernt werden. Sind die Temperaturen sehr heiß und trocken (über 20°C) oder sehr niedrig (unter 10°C), reicht dieses wöchentliche Intervall. Ist es hingegen warm und feucht (10-20°C), sollte das Intervall auf alle 2 Tage erhöht werden.

**Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Tierärzte gerne zur Verfügung.**



